


## КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ



**E.B. Волчкова**

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), Москва, Российская Федерация

### Практические замечания о водобоязни. Сочинение доктора, статского советника и кавалера Енегольма

Бешенство (устаревшее название водобоязнь) было известно ещё с античных времён, и уже тогда его возникновение связывали с укусами собак и волков. Единственным средством для предупреждения развития этого заболевания считалось прижигание раны с целью уничтожения яда, содержавшегося в слюне поражённого бешенством животного. Статья доктора, действительного статского советника Енегольма «Практические замечания о водобоязни», напечатанная в первом номере «Всеобщего журнала врачебной науки» за 1811 год, содержит подробнейшее описание всех существовавших тогда подходов к лечению водобоязни, правда, как отмечает сам автор, без всякой пользы. Тем не менее публикация даже сегодня, в XXI веке, представляет большой интерес для врачей, т.к. подробнейшим образом, эмоционально, с сопротивлением больному описывает по дням и часам, как развивается клиническая картина забытого многими современными докторами заболевания. В статье есть рекомендации по предупреждению распространения бешенства как в городской, так и сельской местности, что не теряет своей актуальности и сегодня, учитывая проблемы, связанные с повсеместным ростом популяции безнадзорных животных, в частности собак и кошек.

**Ключевые слова:** бешенство; водобоязнь; Российская империя; клиническая картина; клинический случай.

**Для цитирования:** Волчкова Е.В. Практические замечания о водобоязни. Сочинение доктора, статского советника и кавалера Енегольма // Эпидемиология и инфекционные болезни. 2020. Т. 25. № 6. С. 269–278. DOI: <https://doi.org/10.17816/EID81637>

**E.V. Volchkova**

The First Sechenov Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow, Russian Federation

### Practical remarks on hydrophobia (Rabies): publication of Eneigm, Medical Doctor, State Counselor and Chevalier of Russian Empire

*Rabies, an outdated name for hydrophobia, has been known since ancient times, and even than its occurrence was associated with the bites of dogs and wolves. The only way to prevent the development of this disease was considered to be cauterization of the wound to destroy the poison contained in the saliva of an animal stricken with rabies. The article of the doctor, the actual state councilor Eneigm "Practical remarks on hydrophobia" published in No. 1 of the General Journal of Medical Science for 1811, really contains a detailed description of all the approaches to the treatment of hydrophobia that existed then, although, as the author notes, without any benefit. Nevertheless, even today, in the 21st century, the article is of great interest to doctors, since in the most detailed way, very emotionally, with empathy for the patient, he describes day by day the development of the clinical picture of the disease, forgotten by many modern doctors. The article contains recommendations for preventing the spread of rabies both in urban and rural areas, which does not lose its relevance today, given the problems associated with the widespread growth of the population of stray animals, in particular dogs and cats.*

**Ключевые слова:** Rabies; hydrophobia; Russian Empire; natural history; case report.

**Для цитирования:** Volchkova EV. Practical remarks on hydrophobia (Rabies): publication of Eneigm, Medical Doctor, State Counselor and Chevalier of Russian Empire. Epidemiology and Infectious Diseases. 2020;25(6):269–278. DOI: <https://doi.org/10.17816/EID81637>


#### Дополнительная информация

**Источник финансирования.** Автор заявляет об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.

**Funding source.** This study was not supported by any external sources of funding.

**Конфликт интересов.** Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

**Competing interests.** The author declare that they have no competing interests.



70

ПРАКТИЧЕСКІЯ ЗАМѢЧАНІЯ О ВОДОБОЯЗНІ.

*Сочиненіе Доктора, Статск. Сов. и Кавал.  
Енегольма.*

Изъ всѣхъ извѣстныхъ намъ болѣзней водобоязни (*hydrophobia*) есть ужаснѣйшая. Въ печальной испинѣ сей увѣрены не только врачи, но и самые просшолюдимы, неоднократно видѣвшіе какъ людей, такъ и животныхъ умиравшихъ отъ оной. А по сему зло сіе заслуживаетъ особенное вниманіе врачей, и всякое со стороны ихъ усиленіе къ испреблению онаго можетъ почеспиться не только выполнениемъ одной изъ важнѣйшихъ обязанностей ихъ, но и особенно выразившись благодѣяніемъ для страждающаго человѣчества. Я не говорю здѣсь о водобоязни, какъ припадкѣ нѣкопорыхъ нервныхъ недуговъ, но о самой той болѣзни, которая проходитъ отъ укушенія, или лучше сказать отъ насилия-

71

спленного сообщенія ядовитой слоны бѣшеныхъ животныхъ, особенно собакъ и волковъ, другимъ животнымъ, которыхъ чрезъ нѣсколько времени пришедшіи отъ того въ подобное бѣшенство и получивъ подобное же измѣненіе въ своей слюнѣ, равнымъ образомъ производятъ сію болѣзнь со всѣми ея припадками и свойствами въ другихъ, укушенныхъ ими животныхъ, и пр. д. Судя по сему, казалось, что ядъ бѣшеныхъ животныхъ особенно действуетъ на систему желѣзъ; но припадки, оказывающіеся въ продолженіи болѣзни, ясно доказываютъ, что въ семъ случаѣ нервы непосредственно и особенно спрѣдупрѣдительно проходятъ отъ разстройства оныхъ. Точныхъ наблюденій, почерпнутыхъ изъ и разыятій труповъ человѣческихъ и животныхъ, также и самые припадки болѣзни вмѣстѣ взятыя, равно какъ и нѣкопорые удачные способы излеченія ея съ великою вѣроѧтносію подтверждаютъ, что близайшая причина сей болѣзни соспонитъ въ

72

воспаленії нервовъ. Заразительность сей болѣзни спољ велика, чѣм по увѣренію описаныхъ врачей, даже дыханіе и кровь бѣшеныхъ опасны для человѣка и другихъ живошныхъ, хопіа впрочемъ Поршаль и Франкъ приводятъ прописные сему примѣры. Есшили первое изъ сихъ мнѣній справедливо и основательно, то не льзъ уже сомнѣваться о скоромъ всасываніи яда въ пѣло, дѣйствующаго пошомъ преимущественно на нервную систему, равно какъ и о томъ, что болѣзнь сія только въ первое время ея можетъ почтиться мѣстною. — Положение сіе, въ подробное изъясненіе кого я не вхожу здѣсь, по краткости сего начертанія, имѣетъ величайшее влияніе на лѣченіе сей болѣзни. Знаменитый Шведскій Архіатеръ Розенъ фонъ Розенштейнъ описываетъ печальный примѣръ, доказывающій чрезвычайную заразительность яда бѣшеныхъ живошныхъ: къ одному поршному въ Стокгольмѣ былъ принесенъ для починки фракъ разорванный, какъ сказывали, у человѣка шедшаго по улицѣ. Поршной, не думая

73

ни о чѣмъ, окончивши работу, по обыкновенію своему, опкусилъ нишку, и какъ зубы у него были нѣсколько худы, то онъ, жевавъ нишку довольно долгое время, прикасался между пѣмъ губами къ зашипому мѣспу. Спустя нѣсколько недѣль онъ получилъ водобоязнь, произхожденія которой никто изъ синипъ не могъ. Фракъ давно уже былъ забытъ. Въ перемежкахъ пароксизмы, прощаюсь съ своей женой и седьмью дѣтьми, сердечно цѣловалъ каждого изъ нихъ и вскорѣ попомъ въ бѣшенствѣ умеръ. По смерти его шо же несчастіе поспѣло весь домъ его. Судебное изслѣдованіе наконецъ открыло, чѣмъ собака, разорвавшая фракъ, была бѣшена, и чѣмъ по щастію человѣкъ, на которомъ разорванъ былъ фракъ, не прешерпѣлъ отъ сего никакихъ худыхъ слѣдовъ. Болѣзнь сія оказывается либо въ первые восемь дней послѣ укушенія, или позже. Были даже примѣры, чѣмъ она оказывалась спустя цѣлой годъ, чѣмъ самое и здѣсь случилось въ Клиникѣ за два года предъ симъ. Грислей увѣряетъ, чѣмъ въ

6

74

одномъ случаѣ болѣзнь оказалась послѣ 17 лѣтъ. Она оказывается скоропостижно, или мало по малу. Такимъ образомъ въ 1790 году я пользовалъ Шведскаго Штабъ-Офицера, возвращавшагося чрезъ Выборгъ въ свое отечество изъ описаныхъ странъ Россіи, гдѣ онъ находился въ пѣну. Въ вечеру, будучи здоровъ, онъ легъ спать, но проснувшись по утру въ 7 часовъ, жаловался на боль въ членахъ, давленіе въ груди и непріятное ощущеніе въ головѣ и глазахъ. Будучи призванъ къ нему чрезъ два часа, я нашелъ, кромѣ выше сказанныхъ припадковъ въ высшей степени, не весьма сильную лихорадку. Больной жаловался, чѣмъ свѣтъ, входящій чрезъ окна, сильно беспокоитъ его, и чѣмъ онъ по утру не имѣлъ ни малѣйшей охопы къ чаю. Полагая, чѣмъ все сіе происходитъ только отъ успалости, отъ долгаго пупи и проспуды, пѣмъ паче, чѣмъ сіе случилось въ Октябрѣ, я прописалъ ему жидкое лѣкарство, сообразное такимъ обстоятельствамъ; но лишь только я поднесъ ему первую ложку сего лѣкар-

75

ства, чѣмъ онъ получилъ вдругъ судороги, и, не могъ уже болѣе глопать никакой жидкости. Съ удивленіемъ увидѣвъ тогда, въ чѣмъ дѣло соспощипъ, послѣ многихъ и различныхъ моихъ вопросовъ, я узналъ на конецъ отъ слуги больнаго, какъ постороннее обстоятельство, чѣмъ собачка, находившаяся и тогда еще при немъ, за четыре мѣсяца укусила господина за носъ; впрочемъ рана вскорѣ зажила и собачка никогда не была бѣшеною. Не смотря на всѣ употребленныя средства, больной умеръ шо же вечера въ 11 часовъ ужаснѣшо смертію, какую я когда либо видѣлъ.

Чаще однако открываются сія болѣзни постепенно. Спустя нѣсколько дней или недѣль послѣ укушенія показываются успалости во всѣхъ членахъ, подирание спины и запылка, беспокойный сонъ, спрашнія сновидѣнія, уныніе, склонность къ уединенію и къ племеннымъ мѣстамъ, головокруженіе, шупость всѣхъ чувствъ, скоропостижное вздрагиваніе, шумъ въ ушахъ, давленіе въ предсердіи,

76

шошнота, частое пошемианье въ глазахъ, шумные вздохи, икоюю прерываемое дыханіе, сиповатый дрожащій голосъ, охладѣніе рукъ и ногъ, блѣдность и опоштаніе всего тѣла, свирѣпой дикой взглядъ, при чёмъ блѣки глазъ бывають шемно-красны. Весьма рѣдко случается, чтобы болѣзнь сія не сопровождается была лихорадкою. Иногда однако никакихъ изъ вычисленныхъ припадковъ не примѣчаются, и больной, до совершенного появленія бѣщенства, жалуясь только на ознобъ и жаръ, и на боли въ членахъ. Нѣкопорые жалуются при томъ на ощущеніе жара въ укушенномъ мѣстѣ, боли въ предсердіи, сильное зженіе во внутренностихъ и великую жажду. Обыкновенно надлежитъ вскорѣ ожидать появленія бѣщенства, еспѣли спраждущій не можетъ болѣе пить безъ судорожныхъ движений глошки. Твердыя вещества больные могутъ глошать всегда почти до самаго конца жизни. Больной не можетъ сносить свѣтъ, ему часто представляются предъ глазами огненные искры. Онъ получаетъ судороги

77

при видѣ всего того, что имѣетъ сходство съ водою, какъ то спекла, бѣлою краскою покрытыхъ вещей, и т. п. Наконецъ открывающееся бѣщенство съ пѣною, клубящеся изъ рта, онъ вспрываетъ, рвѣтъ и бѣтъ все во кругъ себя. Жесточайшія судороги, особенно въ глоткѣ и въ груди причиняютъ ему ужаснѣшія мученія. Онъ реветъ, плюетъ, и, кажущаяся, хочетъ укусить. Сильной его крикъ, часто прерываемый же спокими судорогами, иногда уподобляется лаянію собаки. Бредъ однако не всегда примѣчаются; нѣкопорые больные до конца жизни остаются въ умѣ. Таковыій пароксизмъ продолжается отъ четверти до получаса. Попомъ больной дѣлается спокойнѣе и въ испощеніи своемъ проситъ предстоящихъ беречься отъ него; при чёмъ глубокіе вздохи, сопровождаемые хрипѣніемъ въ груди, прерываютъ рассказываніе его о его мученіяхъ. По мѣрѣ того, какъ перемежки дѣлаются короче, припадки умножаются. Нервная система больнаго бываетъ споль въ раздраженномъ состояніи, что

78

всякой звукъ, всякое слово и малѣйшій сквозной вѣтръ ему несносны. Сильная жажда, которой онъ утолить не въ состояніи, причиняюща ему величайшее мученіе. Еспѣли бѣщенство окажется на третій день по наступленіи первыхъ припадковъ, то больной обыкновенно умираетъ отъ удара (аропл.) при непрерывныхъ судорогахъ на четвертый день отъ появленія оныхъ. Рана отъ укушенія обыкновенно скоро заживаетъ, часто однако воспаляется и предъ наступленіемъ бѣщенства вновь открывается, отдавляя припомъ смрадную красноватую влагу.

Опасность болѣзни зависитъ отъ времени, пропекшаго между укушеніемъ и доспавленіемъ больному дѣйствительной помощи. Еспѣли ядъ имѣлъ уже время совершенно всосаться въ тѣло; то лѣченіе всегда будетъ труднѣе. Все дѣло сосходитъ въ томъ, чтобы предупредить бѣщенство. Я признаюсь чистосердечно, что изъ многихъ больныхъ сего рода пользованныхъ мною ни одинъ не могъ быть избавленъ отъ смерти,

79

еспѣли бѣщенство уже открылось; и напротивъ того ни одинъ изъ нихъ не подвергся бѣщенству въ тѣхъ случаяхъ, когда я заблаговременно былъ привзванъ.

Въ теоріи сей болѣзни важная предлежитъ задача для рѣшенія того, что нерѣдко укушеніе животныхъ, по видимому, не бѣшеныхъ, причиняло водобоязнь. Сіе самое случилось и съ вышеупомянутымъ Шведскимъ Офицеромъ. Не оказывается ли пѣна разъяренного животнаго на организмъ такое же дѣйствіе, какъ и бѣшенаго? Опыты прежнихъ и новыхъ врачей Морганы, ванъ Сентена, Гаубія, Геце, Прокласки, Іона и многихъ другихъ подтверждаютъ сію догадку. Даже спрахъ, испугъ и долговремянное обращеніе съ одержимыми водобоязнию, производили сію болѣзнь, хотя въ такомъ случаѣ надлежитъ отличить оную отъ идиопатической и почитать особенную нервною болѣзни. Примѣры сего рода можно видѣть у Іона и Персиала.

Легко представить можно, что вра-

80

чи всѣхъ временъ и спранъ прилагали всѣ силы къ преодолѣнію сей ужасной болѣзни, откуда и произошло великое множества средствъ, которыхъ были одобряемы прошивь оной. Всѣ сіи средства раздѣляю я на три класса; которые соотвѣтствуютъ премъ, показаніямъ, наблюдаемымъ въ лѣченіи сей болѣзни: 1) возирепатствовашъ всасыванію яда; 2) предупредить дѣйствія его на организмъ, когда онъ всосался, и 3) излѣчить открывшуюся уже водобоязнь.

Къ первому показанію принадлежитъ та осторожность, чтобы вдругъ по укшеніи бѣшеноаго животнаго, совершенно выпереть и очистить рану отъ слюны его, и зажечь ту самую вѣщь, которой сіе учинено. По очищеніи раны, надлежитъ вдругъ наливать въ оную великое количество воды или мочи, и, еслимъ мѣсто позволяетъ, перевязать членъ выше и ниже раны. Гайсартъ думалъ, что ежедневное обмываніе раны водою достаточно для предупрежденія всасанія яда. Послѣ сего совсѣмъ присы-

81

пать рану золою или землею, и прикладывать къ ней гусиной каль, думая, что сіи средства могутъ всосать въ себя ядъ. Сіи средства можно употреблять въ полѣ и въ отдаленіи отъ селенія; но какъ скоро укушенной дойдетъ до жилья, то можно рану снова вымыть щелокомъ, росоломъ, уксусомъ, мыльною водою, или распаромъ другихъ какихъ либо Ѣдкихъ средствъ. При семъ надлежитъ однако спасться въ скорѣйшемъ времени призвать врача, который долженъ вырѣзать рану со всею окружностию до дна ея, не щадя и самыхъ нервовъ. Выжиганіе не споль надежно, поелику оно вдругъ производить спрупъ по всей поверхности раны, покрывающій различные углы ея, въ которыхъ нѣкоторая часть яда скрываться можетъ. Впрочемъ и сей способъ съ пользою можно употреблять при поверхностныхъ ранахъ на тонкихъ часпяхъ шѣла, равно какъ и при глубокихъ, проспыхъ ранахъ, когда т. е. не многія мѣста разорваны, и слѣдовательно рана не имѣетъ открытихъ угловъ: но только надлежитъ прижигать рану

82

раскаленнымъ желѣзомъ до тѣхъ поръ, пока она совершенно будетъ разспрѣна. С совсѣмъ также по чаще присыпать рану сладкою ртутию, и перевязывать пласыремъ, изѣстинамъ подъ именемъ (*Empl. deranis cum tinc.*), (*Лефлерд*). По моему мнѣнію въ первомъ случаѣ довольно только вымыть рану щелокомъ или росоломъ, а въ послѣднемъ надлежитъ спосѣщеспивовашъ нагноенію.

Если по робости больнаго или врача оба сіи способа вырѣзаніе т. е. и выжиганіе пропущены; то не остается ничего другаго къ воспрепатствованію всасанія яда, какъ только привести рану въ сильное нагноеніе, которое должно поддерживать отъ 4 до 6 недѣль. Для сего намѣренія, кроме производящихъ нагноеніе (*digestiva*) употребляются различныя Ѣдкія и раздражающія средства, какъ то: сереброселишренный камень, (*nitras argenti fusus*), Ѣдкій пошашъ, порошокъ испанскихъ мушекъ, и т. п. *Ле Ру* похвалилъ сюрмянное масло (*butyr. antim.*), которое *Сабатъ* уже

83

одобрялъ, какъ Ѣдкое средство, и которое французской врачи *Тирри Вальдажу* нашель весьма дѣйствительнымъ. Онъ всегда употреблялъ сіе средство съ пользою въ печени и лѣпѣ, даже черезъ 12 дней послѣ укшенія и при оказавшейся уже водобоязни. Сперва разширивъ рану онъ вымываетъ оную, и попомъ распространяетъ кисточкою; обмоченою въ сюрмянное масло. Слѣдующее за симъ нагноеніе поддерживается нѣсколько недѣль. Сіе средство во всякомъ отношеніи заслуживаетъ преимущество предъ раскаленнымъ желѣзомъ, которое отъ влагъ, находящихся въ ранѣ, отъ частили лишающееся своего дѣйствія, между тѣмъ какъ сюрмянное масло, по своей жидкости весьма удобно проникаетъ во всѣ углы раны.

Для укрощенія первыхъ волненій крови даютъ прохладительная эмульсія, кислое питье, также средства, дѣйствующія на испарину и мочу.

Поелику всегда трудно опредѣлить, всосался ли уже ядъ, и когда именно; то я увѣренъ, что самая по видимому излишняя предоспорожность прошивъ

84

следствій онаго здѣсь никогда не можетъ быти излишнею. Изъ числа многихъ предохранительныхъ средствъ я намѣренъ упомянуть здѣсь только о тѣхъ, кои наибольше похваляемы были. Первое мѣсто между ними занимаешь ртуть и красавица (Belladonna). Для сего намѣренія даютъ внутрь сладкую ртуть по одному грану и болѣе два раза въ день, или разтворивъ ртуть полдрахмы въ полупорехъ драхмахъ селипренной кислоты, даютъ опть 1 до 5 капель въ двухъ ложкахъ перегнанной воды при раза въ день. Англичане отдаютъ преимущество минеральному штурпетту (turget. minerales) предъ всѣми ртутными составами. При употреблениіи сихъ средствъ укушенное мѣсто напирается ртутью; надлежитъ однако при семъ спараться, чтобы не произвести слюнотеченія. За нѣсколько уже лѣтъ Фуркроа догадывался, что пресыщенная соляная кислота (acidum maria. oxygenatum) можетъ разсѣять водобоязенный ядъ, впущеній въ рану, и действительно нѣсколько разъ употребляли ону сна-

85

ружки, какъ юдкое средство вскорѣ послѣ укушенія. Клюзель увѣряетъ, чѣмногимъ больнымъ, укушеннымъ бѣшенымъ волкомъ и перенесеннымъ попомъ въ Бордовскую гощипаль, давали ону кислоту внутрь, послѣ чего всѣ они выздоровѣли. Обыкновенно даютъ оной до двухъ драхмъ въ восьми унціяхъ перегнанной воды или смягчительного опвара, въ теченіи 24 часовъ.

Трава и корень красавицы произвели въ лѣченіи сей болѣзни важную эпоху. Многіе щастливые опыты подтвердили, хотя не особенную силу (*vis specifica*), однако хорошее дѣйствіе ея. Поэлику предписаніе Минха, которыи прежде всѣхъ началъ употреблять сіе средство, слишкомъ обширно; то лучше давать оное чрезъ 3 или 4 часа опть 2 до 8 гранъ. Неизлишне упомянуть здѣсь, что распыленіе сіе, собираемое въ нашихъ спраинахъ, не имѣть споль хорошаго дѣйствія, какъ получаемое изъ теплыхъ странъ. А по сему весьма хорошо постепенно умножать приемъ онаго до тѣхъ поръ, пока въ легкой степени о-

86

кажутся сухость неба во рту, сжатіе пищеварѣнія горла, затруднительное глоттаніе, разширеніе зѣницы, постемнѣніе зѣнія и головокруженіе.—

Теденб., Консбрюхъ и другіе предпочитаютъ корню листы красавицы.

Консбрюхъ и Селле похваляютъ особенное пипье пропитъ бѣшенства (ratio antiflyssa), составляемое изъ порошка осмы маекъ (meloe malialis), полъунции шеріака Андромахова, двухъ драхмъ соли оленѣаго рога, одной драхмы камфоры и осмы унції Миндерерова спирта, котороое надлежитъ давать два раза въ день по половинѣ или по цѣлой столовой ложкѣ. Гарлесъ почишаєтъ превосходнѣйшимъ средствомъ дурманъ (*datura stramonium*); а же Ру шаковыи же полагаетъ юдкій нашапырный спиртъ, даваемый два раза въ день по 12 капель въ чаю изъ бузинныхъ цвѣтовъ. Равнымъ образомъ и другіе средства различными врачами похваляемы были, какъ то: лепучія щелочныя соли, камфора, скорьма, теплые и холодныя бани, и пр.

Професоръ Гильдебрандъ похваляеть

87

опилки писового дерева (*taxus baccata*) и плаунъ (*Lycopodium clavatum*), не только какъ предохранительная лѣкарства, но и какъ дѣйствительная пропиць самаго бѣшенства. Оба сіи средства варятъ въ неопределенному количествѣ, и опваръ сей употребляютъ частію для обмыванія ранъ, частію же даютъ его внутрь людямъ и животнымъ въ великихъ пріемахъ. Въ Галиціи на границахъ Валахіи и Венгріи оба сіи средства употребляются съ пользою.

Въ Мизовомъ (Meaze) Журналъ изобрѣтеній похваляется еще одно изъ деревнихъ средствъ, т. е. деревянце масло, употребляемое въ большихъ пріемахъ внутрь и снаружи, Унцеръ же и Леонисъ прибавляютъ къ нему еще уксусъ.

Въ Вестфалии правильствомъ было куплено и обнародовано нижеслѣдующее въ шайнѣ хранившееся средство: возмѣтъ правъ: садовой руты, ворсильной щопки по 8 скруп.: съ половиною, молодила 8 драхмъ съ половиною, цибета одинъ гранъ (*Rp. ruth. hortens. dipsaci fullonum aa. 3vij. sedi acris 3i 3b zibethi*

88

pariss. gr j) изрѣзавъ шравы въ мѣлкія часпи, насыпающи на хлѣбъ масломъ намазанный, и на первый кусокъ кладуши цибетъ, и такими образомъ больной долженъ съѣсть все сіе лѣкарство. Прежде и послѣ употребленія сего средства больной долженъ нѣсколько часовъ воздѣржаться отъ пищи, послѣ чего онъ можетъ выпить нѣсколько чаю или кофію, остерегаясь при томъ всякой жирной\* пищи и разгорячающихъ напитковъ, и дѣлая умѣренное пѣлодвиженіе. Еспѣли по принятіи лѣкарства послѣдовала рвота; то на слѣдующій дѣнь надлежало повторить приемъ онаго. Предѣль употребленіемъ лѣкарства дѣлали настѣнія въ ранѣ, и, вымывъ ону росоломъ, лѣчили какъ обыкновенную рану, спрыснувъ при томъ лицо больного холодною водою. Многіе\* удачные опыты, здѣланые во всей Вестфалии чрезъ множества лѣтъ, совершенно оправдали пользу сего средства. Такимъ же образомъ за 40 лѣтъ Прусскій Король купилъ шайное средство прошивъ водобоязни, состоявшее изъ маекъ (*melde maialis*),

89

и оказывавшее нерѣдко полезное дѣйствіе. Самыя испанскія мухи (*Littae vesicatoriae*) безъ сомнѣнія заслуживающи бытие испытаны пропивъ жеспокой сей болѣзни. Кажется и въ самомъ уже обнаружившемся бѣщенствѣ можно ожидать хорошаго дѣйствія отъ оныхъ; ибо въ сполбнякѣ (*tetanus*), съ коимъ сія болѣзнь имѣеть великое сходство, настойка испанскихъ мухъ употребляема была *Самуиломъ Брауномъ* съ немалымъ успѣхомъ. Онъ давалъ сіе средство въ такихъ пріемахъ, что произходили отъ этого рвота, жжение въ желудкѣ и другіе признаки воспаленія брюшныхъ внутренностей, при появлѣніи коихъ сполбнякъ совершенно прекращался, и слѣдствіено опаснѣйшая болѣзнь перемѣнялась въ менѣе опасную и удобнѣе излѣчимую. Таковое оправданное употребленіе испанскихъ мухъ не можетъ ли иногда оказывать и въ водобоязни подобного дѣйствія? Изъ домашнихъ нашихъ произрашній простой народъ, кромѣ многихъ другихъ, употребляетъ *старолубку* (*gentiana pratensis*) и *грецкой бѣлльярьинѣ* (*pole-*

7

90

*mon. coeruleum*), *акрок* (*genista tinctoria*) и *пурпурникъ* или *шильникъ водяной* (*Alisma Plantago*), какъ въ порошкахъ, такъ и въ опварахъ. Послѣднее изъ сихъ средствъ заслуживаетъ особенное вниманіе врачей; ибо по дословѣрѣніямъ наблюденіямъ, сообщеннымъ Вольному Економическому Общесипу Колледжскимъ Собѣщникомъ *Левшиномъ*, одного крупнаго корешка сего распѣнія, а малыхъ двухъ или трехъ, исперпихъ въ порошокъ, на одинъ пріемъ, и насыпанныхъ на кусокъ хлѣба, намазанного коровьимъ масломъ, довольно бывающе для испрѣблѣнія водобоязни яда въ людяхъ и животныхъ\*). Повтореніе таковыхъ пріемовъ до двухъ, а много уже до трехъ разъ, весьма рѣдко нужно бывающъ. Г. *Левшинъ* былъ очевиднымъ свидѣтелемъ, что сіе средство оказывало цѣлипельное свое дѣйствіе, даже послѣ оказавшейся уже водобоязни, и что люди и животныя избавлены были помошью онаго отъ ужасныхъ слѣдствій сей болѣзни.

\* См. Полная Система практик. сельск. домо-водства Т. VIII. стр. 225.

91

Диетическое содержаніе большаго, при предохранительномъ его лѣченіи, состоитъ въ легкомъ пѣлодвиженіи, при умѣренной температурѣ, и въ избѣганіи всякихъ жирныхъ, неудобоваримыхъ яствъ. На сей конецъ похваляются овчье и коровье молоко, также паштанице (*lac eurytratum*) и вообще kleikie напитки, въ соединеніи съ такими средствами, кои приуппляютъ раздражительность. Еспѣли, не смотря на всѣ предохранительные средства, окажущіяся предѣщники водобоязни; то надлежитъ употреблять камфору, мускусъ и опій въ пилиоляхъ, постепенно умножая ихъ пріемъ, также промывательная изъ вонючей камеди (*asa foetida*) съ беленнымъ масломъ. Не отчаиваясь въ успѣхѣ, можно также всегда ожидать еще нѣкоторой помоши и отъ сонной одури (*belladonna*). Присьемъ надлежитъ напиратьшею, спину и другія особенно спраждущія часпи рѣпучною мазью съ опіемъ. Одобрѣли также, кромѣ многихъ другихъ пропивусудорожныхъ и нервныхъ средствъ, расшворъ шеріака въ лепучемъ нашашырномъ спир-

\*

92

шѣ, маунной корень, лепучія щелочная соли, вонючую камедь, скоропоспирожное бросаніе въ воду, или пусканіе холодной воды каплями на шѣло больного съ нѣкоторой высоты (*Embrocatio*). Ванны изъ щелочныхъ солей, растворенныхъ въ теплой водѣ, неоднократно съ пользою мною употребляемы были. *Дезидератъ* замѣшилъ, что шѣ больные выздоравливали, кои находились на проливномъ дождѣ. При многократномъ лѣченіи больныхъ сего рода, я не употреблялъ другихъ средствъ, кромъ сладкой ртути или красавицы, втирая при томъ ртутную мазь; въ первомъ случаѣ до появленія признаковъ предстоящаго слюнопеченія, а во второмъ до наступленія выше-сказанныхъ припадковъ, происходящихъ отъ дѣйствія красавицы. Но вырѣзываніе раны всегда было для меня главнейшимъ предметомъ, послѣ чего я ежедневно вымывалъ оную растворомъ попаша, и въ прочемъ ни мало не препятствовалъ ея заживанію. Поелику нельзя определить времени совершенного всосанія яда; то я, будучи приглашенъ къ боль-

93

ному на другой или на прешій день, и въ сіе время не упускаль вырѣзыванія раны. При употреблениі красавицы особенно должно обращать вниманіе на полнокровіе и нечистоты первыхъ пушей. Впрочемъ, придерживаясь выше сказанныхъ правилъ, я часно доспигалъ желаемой цѣли.

Ежели рана зажила до прибытія врача, и слѣдовательно ядъ по всей вѣроятности уже всосался; то я не понимаю, къ чему бы служило расправлять оную чрезъ насыщенія и приводить въ нагноеніе. Что зажившія раны, при наступленіи бѣщенспва, иногда вновь воспаляются, и сами собою опкрываются, сіе не показываетъ ничего, кромъ обыкновенныхъ явлений. всякая рана или язва недавно зажившая обыкновенно вновь опкрывается у всякаго, страждущаго лихорадкою, опѣдѣляя при томъ, вмѣсто гноя, худую сукровицу. При водобоязни, какъ выше уже сказано, весьма въ рѣдкихъ только случаяхъ, не примѣчаются лихорадка; слѣдовательно очень часто воспаленіе раны сопровождается оною.

94

**При сѣмъ лихорадка болѣе или менѣе обнаруживается уже при наступленіи предвѣстниковъ воспаленія.** Нервы раненой части какъ и прочія при общемъ воспаленіи не могутъ не участвовать въ оному. Въ шѣлѣ одной дѣвушки, умершей отъ водобоязни, *Герардини* нашелъ мозгъ и всѣ произоходящіе отъ него нервы воспалеными. Такимъ же образомъ во многихъ другихъ случаяхъ, при вскрываніи труповъ найдено, что желудокъ и многія другія внутренности, особенно изобилующія нервами, были воспалены. По сему-то весьма сомнительно, чтобы рана отъ укушенія бѣшенаго животнаго могла зажить, пока ядъ въ ней кроется. Раны отъ укушенія ядовитыхъ змѣй удерживаютъ свое свойство даже послѣ всосанія яда. Между тѣмъ никакая рана не заживаетъ такъ скоро, какъ произошедшая отъ укушенія бѣшеной собаки. И такъ я думаю, что ядъ поглощается всасывающими сосудами до заживленія раны, и что послѣ сего не должно уже искашь болѣзньшпорного вещества въ укушенномъ мѣстѣ, какъ то у-

95

тверждаютъ *Гунтеръ* и другіе. Съ большою вѣроятностію можно полагать, что вещества сіе, о существѣ коихораго, къ сожалѣнію, мы ничего не знаемъ, раздѣлившись прежде по всему шѣлу, скрѣте нѣсколько мѣсяцівъ можетъ скрываться въ оному, не оказывая своего дѣйствія, нежели, чтобы оно въ цѣлости своей могло оспаваться въ одномъ мѣстѣ. Сходство съ венерическимъ ядомъ подтверждаетъ сіе мнѣніе. Перелой и венерическая язвы отъ непосредственнаго мѣстнаго зараженія скоро опкрываются, между тѣмъ какъ вскорѣ нившися повсемѣшвенная венерическая болѣзнь можетъ скрываться въ шѣлу чрезъ многіе годы. По сему мнѣ кажется излишнимъ расправлять зажившую рану насыщеніями и шпанскими мушками, и приводить оную въ нагноеніе, для выведенія чрезъ то яда изъ первої и желѣзистой системы, чрезъ что первые припадки въ шѣлу болѣе усиливаются. Впрочемъ должно признаться, что я видѣлъ также многихъ умершихъ отъ бѣщенспва, у которыхъ зажившія

96

раны совсемъ не воспалялись и не опухали.

Въ городахъ, при благоустроенной Полиції, гдѣ всякой хозяинъ обязанъ смотрѣть за своими собаками, и гдѣ бывающихъ въ жаркіе лѣтніе дни и сильные морозы Полиція величъ убивать безъ пощады, зло сіе никогда почти случиться не можетъ. Надлежитъ однако замѣтить при семъ, что жарь и чрезмѣрный холодъ не суть единственная причины бѣшенства собакъ и волковъ; напротивъ того голодъ, жажда и неудовлетворенія похоль могутъ также произвести оное. Такимъ образомъ недавно случилось въ Ораніенбаумѣ, что при весьма легкомъ холода едва доходившемъ до 6 град. Реом: бѣшеной волкъ перекусалъ семнадцать поселянъ.

Въ деревняхъ нужно принять на сей конецъ другія мѣры. Надлежитъ въ церквяхъ, или посредствомъ печатныхъ листовъ чрезъ Врачебную Управу, научить поселянъ, не только какъ поступать въ тѣхъ случаяхъ, если кто укушенъ бѣшенымъ животнымъ, но и какимъ обра-

97

зомъ предупреждать шаковое нещастіе. Сюда принадлежитъ распознаніе бѣшеной собаки, по особеннымъ наиболѣе слѣдующимъ признакамъ: собака дѣлается унылою, необыкновеннымъ образомъ Ѳсѣть и пѣсть, перяешь помомъ позывъ къ тому и другому, удаляется отъ всякихъ животныхъ, не узнаетъ своего хозяина, ходитъ или бѣгаешь повсюду голову и опустя хвостъ, на ходу шатаешься, и имѣешь глаза мутные и красноватые; избѣгаешь воды, и при видѣ оной дрожишь; послѣ сего, высунувъ языкъ и испуская пѣну изъ рта,кусаешь камни, бѣся головою о стѣну и другіе предметы ей встрѣчающіеся. Шерсть на ней обыкновенно болѣе вздымаешься къ переди. На конецъ она начинаетъ кусать каждое попадающееся ей животное, безъ всякаго лаянія; удаляется иногда на нѣсколько верстъ отъ двора, и напослѣдокъ, будучи совершенно изнурена, въ судорогахъ издыхаетъ. Всякой хозяинъ дома, и сверхъ того старосты и десятскіе въ деревняхъ должны обращаться на сіе особенное вни-

98

маніе, и всякую подозрительную собаку должны приказывать убивать.

Ежели шакая собака укусила уже другихъ животныхъ; то всегда лучше и безопаснѣе величь ихъ вдругъ побить, и глубоко закопать въ землю съ кожами. —

Поелику частно неизвѣстно, бѣшена ли укусившая собака; въ шакомъ случаѣ обыкновенно запираютъ ону для точнаго увѣренія въ семъ дѣлѣ; еслими собака окажется не бѣшеною, то чрезъ сіе самое уничтожается спрахъ укушенаго, имѣющій немаловажное влияніе на первную его систему; въ противномъ же случаѣ причиненное зло не заѣлается хуже.

**ОБ АВТОРЕ**

**Волчкова Елена Васильевна**, д.м.н., профессор;  
**адрес:** 119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2;  
**ORCID:** <https://orcid.org/0000-0003-4581-4510>;  
**eLibrary SPIN:** 3342-4681; **e-mail:** infection\_mma@mail.ru

**AUTHOR INFO**

**Elena V. Volchkova**, MD, Dr. Sci. (Med), Professor;  
**address:** 8 bld. 2 Trubetskaya street, 119991, Moscow, Russia;  
**ORCID:** <https://orcid.org/0000-0003-4581-4510>;  
**eLibrary SPIN:** 3342-4681; **e-mail:** infection\_mma@mail.ru

Поступила 04.10.2021  
Принята к печати 04.10.2021  
Опубликована 11.10.2021

Received 04.10.2021  
Accepted 04.10.2021  
Published 11.10.2021